

在使用 NUPLAZID<sup>®</sup> (pimavanserin) 之前和每次再度配藥時，均請閱讀本重要資訊，因為資訊可能有所修改。本資訊無法取代與您的醫療人員討論關於您的醫療病況或您的治療。



## NUPLAZID 可用於治療哪些病況？

NUPLAZID (new-PLA-zid) 是用於治療巴金森氏症精神疾病相關幻覺和妄想的處方藥。當巴金森氏症患者開始出現幻覺（例如：看見、聽見或遇到了別人沒有的事物）和／或妄想（比如相信不真實的事情）時，便會發生這些非運動性症狀。



## 我應知道 NUPLAZID 的哪些最重要資訊？

因為意識混淆和記憶喪失（失智症）而與現實脫節（精神疾病）的老年患者若使用諸如 NUPLAZID 等藥物，可能會增加死亡風險。NUPLAZID 未核准用於治療經歷精神症狀的失智症患者，除非其幻覺和妄想與巴金森氏症相關。



## 哪些人不應使用 NUPLAZID？

**若您曾對 NUPLAZID 的任何成分發生過敏反應，請勿使用 NUPLAZID。**過敏反應包括皮疹；蕁麻疹；舌、口、唇、或臉腫脹；喉嚨發緊及呼吸急促。

**若您患有會使心律改變的特定心臟疾病，請勿使用 NUPLAZID。**請務必向您的醫療人員洽詢此項可能副作用。若您感覺心跳改變，請致電您的醫療人員。



## 我應該知道 NUPLAZID 的哪些其他相關警語？

**QT 間隔延長：**NUPLAZID 可能增加心律改變的風險。若 NUPLAZID 併用已知會延長 QT 間隔的特定其他藥物，可能會增加此風險。請將您目前或近期曾經使用的所有藥物告知您的醫療人員。

有關其他重要安全性資料，請參閱背頁。



## 哪些藥物有可能與 NUPLAZID® (pimavanserin) 產生交互作用？

請將您使用的所有藥物告知您的醫療人員。其他藥物可能會影響 NUPLAZID 的作用。有些藥物不應與 NUPLAZID 一起服用。您的醫療人員可告訴您 NUPLAZID 是否可與您的其他藥物安全併用。未先與您的醫療人員討論時，請勿在 NUPLAZID 治療期間開始或停止使用任何藥物。



## NUPLAZID 有哪些常見的副作用？

NUPLAZID 的常見副作用包括腿部或手臂腫脹、噁心、意識混淆、幻覺、便秘，以及一般行走狀態改變。以上並未列出 NUPLAZID 所有可能的副作用。如需關於本藥物的其他資訊，請向您的醫療人員或藥師諮詢。



## NUPLAZID 能否與其他巴金森氏症藥物一起使用？

您在使用 NUPLAZID 時無須調整 carbidopa/levodopa 藥物的劑量。請將您目前使用的所有藥物告知您的醫療人員。



## 如何服用 NUPLAZID ？

NUPLAZID 的建議劑量是每次口服一粒 34 mg 膠囊，每天一次，可隨食物也可不隨食物服用；在每天大約同一時間或按照您醫療人員的處方服用。



## 我如何取得 NUPLAZID ？

若您的醫療人員為您開立 NUPLAZID，其可能會為您註冊 [Acadia Connect](#)®。此項支持計劃可協助您或您的親友取得 NUPLAZID 的保險承保。請造訪 [acadiaconnect.com](#) 瞭解更多資訊。

### 其他重要安全須知

目前尚不知曉 NUPLAZID 對未滿 18 歲的患者是否安全有效。

這並非一份完整的安全須知。如需完整的安全性資訊，請參閱隨附的完整處方資訊（包括方框警語），或造訪 [NUPLAZID.com](#)。

若您對本藥物或本須知有任何疑問，務必與您的醫療人員討論。

我們鼓勵您向美國食品藥物管理局 (Food and Drug Administration, FDA) 通報處方藥的不良副作用。請造訪 [www.fda.gov/medwatch](#)，或致電 1-800-FDA-1088。您也可致電 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342) 聯絡 Acadia Pharmaceuticals Inc.。