

在服用 NUPLAZID[®]（匹莫范色林）之前以及每次续配药物时，请阅读此重要信息，因为信息可能会变更。此信息无法代替您与医护人员针对您的医疗状况或您的治疗所进行的交谈。



NUPLAZID 用于治疗哪些疾病？

NUPLAZID（读音：new-PLA-zid）是一种处方药，用于治疗与帕金森病性精神病相关的幻觉和妄想。这些非运动性症状出现在帕金森病患者开始产生幻觉（比如看见、听见或体验到其他人没有看到、听到或体验到的东西）和/或妄想（比如相信并不真实的事情）时。



关于 NUPLAZID，我应该了解的最重要信息有哪些？

像 NUPLAZID 这样的药物可能增加由于意识模糊和记忆丧失（痴呆症）而与现实脱节（精神病）的老年人的死亡风险。NUPLAZID 未被批准用于治疗与帕金森氏病性精神病所伴发的幻觉和妄想无关的痴呆症相关性精神病患者。



哪些人不应该服用 NUPLAZID？

如果您对 NUPLAZID 中的任何成分过敏，请勿服用 NUPLAZID。过敏反应包括皮疹，荨麻疹，舌、嘴、唇或面部肿胀，喉咙紧绷和呼吸急促。

如果您患有某些可导致心律变化的心脏疾病，请勿服用 NUPLAZID。与您的医护人员就此类可能发生的副作用进行交谈是非常重要的。如果您觉得您的心跳有所变化，应打电话给您的医护人员。



我应该了解关于 NUPLAZID 的哪些其他警告？

QT 间期延长：NUPLAZID 可能增加您的心律变化风险。如果 NUPLAZID 与已知能延长 QT 间期的某些其他药物一起服用，可能会增加这种风险。告诉您的医护人员您使用的或最近使用过的所有药物。

有关附加的重要安全信息，请参见此页的背面。



哪些药物可能与 NUPLAZID®（匹莫范色林）发生相互作用？

告诉您的医护人员您所使用的所有药物。其他药物可能会影响 NUPLAZID 发挥效用的方式。一些药物不应与 NUPLAZID 一起服用。您的医护人员可以告诉您 NUPLAZID 与您的其他药物一起服用是否安全。如果未事先与您的医护人员讨论，在服用 NUPLAZID 期间，切勿启用或停用任何药物。



NUPLAZID 的常见副作用有哪些？

NUPLAZID 最常见的副作用包括双腿或双臂肿胀、恶心、意识模糊、幻觉、便秘，以及对正常行走造成的改变。这些并非 NUPLAZID 的所有潜在副作用。欲了解更多信息，请向您的医护人员或药剂师咨询这种药物。




我可以同时服用 NUPLAZID 和其他帕金森病药物吗？

您可以服用 NUPLAZID 并且无需调整卡比多巴/左旋多巴药物的剂量。告诉您的医护人员您正在使用的所有药物。



我该如何服用 NUPLAZID？

建议每天一次口服一粒 34 毫克的 NUPLAZID 胶囊，随餐或不随餐服用均可，每天请在大约同一时间服用，或按照医护人员的处方服用。



我可如何获得 NUPLAZID？

如果您的医护人员为您开了 NUPLAZID 的处方，则他或她可能把您登记到 [Acadia Connect](https://www.acadiaconnect.com)®。这项支持计划能帮助您或您的亲人，使你们涵盖在 NUPLAZID 保险的理赔范围内。访问 [acadiaconnect.com](https://www.acadiaconnect.com) 了解更多信息。

附加的重要安全信息

NUPLAZID 对 18 岁以下人士是否安全有效尚属未知。

这并非完整的安全信息。欲了解所有的安全信息，请阅读所附的完整[处方信息](#)，包括**黑框警告**，或访问 [NUPLAZID.com](https://www.nuplazid.com)。

如果您对该药物或者此信息有任何疑问，请务必与您的医护人员讨论。

我们鼓励您向 FDA 报告处方药的不良反应。请访问 www.fda.gov/medwatch 或致电 1-800-FDA-1088。您也可以拨打阿卡迪亚制药公司 (Acadia Pharmaceuticals Inc.) 的电话 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342)。