

THÔNG TIN QUAN TRỌNG CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

ONCE-DAILY
NUPLAZID[®]
(pimavanserin) 34mg capsules

Xin đọc thông tin quan trọng này trước khi dùng NUPLAZID[®] (pimavanserin) và mỗi lần quý vị mua thêm thuốc do thông tin có thể thay đổi. Thông tin này không thay thế cho việc nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ y tế về tình trạng bệnh hoặc điều trị của quý vị.



NUPLAZID ĐƯỢC DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

NUPLAZID (new-PLA-zid) là thuốc kê toa được dùng để điều trị chứng ảo giác và hoang tưởng do chứng rối loạn tâm thần ở bệnh Parkinson. Các triệu chứng không liên quan đến vận động này xảy ra khi người bị bệnh Parkinson bắt đầu có ảo giác (như nhìn, nghe hoặc thấy sự vật hay sự việc không có thật) và/hoặc hoang tưởng (như tin vào các sự vật hay sự việc không có thật).



THÔNG TIN QUAN TRỌNG NHẤT MÀ TÔI CẦN BIẾT VỀ NUPLAZID LÀ GÌ?

Các loại thuốc như NUPLAZID có thể tăng nguy cơ tử vong ở lão niên không còn ý thức với thực tế (bị bệnh tâm thần) do lú lẫn và mất trí nhớ (sa sút trí tuệ). NUPLAZID không được chấp thuận để điều trị cho bệnh nhân sa sút trí tuệ bị rối loạn tâm thần, trừ khi tình trạng ảo giác và hoang tưởng của họ có liên quan đến bệnh Parkinson.



NHỮNG AI KHÔNG NÊN DÙNG NUPLAZID?

Không dùng NUPLAZID nếu quý vị bị dị ứng với bất cứ thành phần nào trong NUPLAZID. Các phản ứng dị ứng bao gồm phát ban, nổi mề đay, sưng lưỡi, miệng, môi, hoặc mặt, cứng cổ họng và thở hỗn hển.

Không dùng NUPLAZID nếu quý vị bị một số tình trạng tim mà có thể làm thay đổi nhịp tim của quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải cho nhà cung cấp dịch vụ y tế biết về phản ứng phụ tiềm ẩn này. Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ y tế nếu quý vị cảm thấy nhịp tim của mình thay đổi.



TÔI CẦN BIẾT NHỮNG CẢNH GIÁC NÀO KHÁC VỀ NUPLAZID?

Kéo Dài Khoảng QT: NUPLAZID có thể làm tăng nguy cơ thay đổi nhịp tim của quý vị. Nguy cơ này có thể gia tăng nếu dùng NUPLAZID cùng với một số thuốc khác được biết là sẽ kéo dài khoảng QT. Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị biết về mọi loại thuốc quý vị dùng hoặc mới dùng gần đây.

Xin đọc trang sau để biết thêm Thông Tin An Toàn Quan Trọng.



CÁC THUỐC NÀO CÓ THỂ TƯƠNG TÁC VỚI NUPLAZID® (pimavanserin)?

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị biết về mọi loại thuốc quý vị dùng. Các thuốc khác có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của NUPLAZID. Có một số thuốc không được dùng cùng với NUPLAZID. Nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị có thể cho biết việc dùng NUPLAZID cùng với các thuốc khác của quý vị có an toàn hay không. Đừng bắt đầu hoặc ngừng dùng bất kỳ loại thuốc nào khi đang dùng NUPLAZID mà không nói trước với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị.



NUPLAZID CÓ THỂ CÓ NHỮNG TÁC DỤNG PHỤ THÔNG THƯỜNG NÀO?

Các **tác dụng phụ thông thường nhất** của NUPLAZID bao gồm sưng chân hoặc cánh tay, buồn nôn, bối rối, ảo giác, táo bón, và thay đổi cách đi bộ thông thường. Các triệu chứng nêu trên không phải là toàn bộ các tác dụng phụ có thể có của NUPLAZID. Hãy hỏi nhà cung cấp dịch vụ y tế hoặc dược sĩ của quý vị về thuốc này để biết thêm thông tin.



TÔI CÓ THỂ DÙNG NUPLAZID CÙNG VỚI CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH PARKINSON KHÁC KHÔNG?

Quý vị có thể dùng NUPLAZID mà không cần điều chỉnh liều lượng thuốc carbidopa/levodopa. Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị biết về mọi loại thuốc mà quý vị đang dùng.



TÔI DÙNG NUPLAZID NHƯ THẾ NÀO?

Liều dùng khuyến cáo của NUPLAZID là một viên nang 34 mg, một lần mỗi ngày uống qua miệng, cùng hoặc không cùng với thực phẩm, uống cùng giờ mỗi ngày, hoặc như nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị đã kê toa.



TÔI NHẬN ĐƯỢC NUPLAZID BẰNG CÁCH NÀO?

Nếu nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị kê toa thuốc NUPLAZID cho quý vị, họ có thể ghi danh cho quý vị vào [Acadia Connect®](#). Chương trình hỗ trợ này có thể giúp quý vị hoặc người thân của quý vị được trả bảo hiểm cho NUPLAZID. Hãy truy cập acadiaconnect.com để tìm hiểu thêm.

Thông Tin An Toàn Quan Trọng Bổ Sung

Hiện chưa biết NUPLAZID có an toàn và hiệu quả với người dưới 18 tuổi hay không.

Thông tin an toàn trong đây không phải là thông tin đầy đủ. Để biết thông tin an toàn đầy đủ, xin đọc [Thông Tin Kê Toa](#) đầy đủ kèm theo, bao gồm **Ô CẢNH BÁO**, hoặc truy cập NUPLAZID.com.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thuốc này hoặc thông tin này, xin hãy bàn thảo với nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về các vấn đề đó.

Chúng tôi khuyên quý vị nên báo cáo các tác dụng phụ tiêu cực của thuốc kê toa cho Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration, hay FDA). Truy cập vào trang www.fda.gov/medwatch hoặc gọi số 1-800-FDA-1088. Quý vị cũng có thể gọi Acadia Pharmaceuticals Inc. theo số 1-844-4ACADIA (1-844-422-2342).